

Skema til monitorering af leverfunktion ved behandling med agomelatin

Godkendt indikation: Behandling af svære depressive episoder hos voksne


Patientens navn: _____ Dato for initiering: _____

<input type="checkbox"/> 25 mg	
<input type="checkbox"/> Før initiering af 25 mg	
ALAT _____ U/I	ASAT _____ U/I
<input type="checkbox"/> Uge 3	
ALAT _____ U/I	ASAT _____ U/I
<input type="checkbox"/> Uge 6	
ALAT _____ U/I	ASAT _____ U/I
<input type="checkbox"/> Uge 12	
ALAT _____ U/I	ASAT _____ U/I
<input type="checkbox"/> Uge 24	
ALAT _____ U/I	ASAT _____ U/I

Test udføres, når det er klinisk indiceret.

<input type="checkbox"/> Hvis dosis øges til 50 mg, genstartes monitoreringsplan.	
<input type="checkbox"/> Initiering af 50 mg	
ALAT _____ U/I	ASAT _____ U/I
<input type="checkbox"/> Uge 3	
ALAT _____ U/I	ASAT _____ U/I
<input type="checkbox"/> Uge 6	
ALAT _____ U/I	ASAT _____ U/I
<input type="checkbox"/> Uge 12	
ALAT _____ U/I	ASAT _____ U/I
<input type="checkbox"/> Uge 24	
ALAT _____ U/I	ASAT _____ U/I

Test udføres, når det er klinisk indiceret.



* F.eks. mørkfarvet urin, lys afføring, gulfarvning af hud/øjne, smerter i højre side af øvre abdomen, vedvarende nyopstået og uforklarlig træthed